

INFORMACIÓN TÉCNICA

SINTOMATOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

Dificultad respiratoria

- Es el más grave aunque no de los primeros en aparecer, puede acompañarse o no de tos.
- Sensación de que sus pulmones no son capaces de llenarse de aire
- Comunicar con los servicios médicos

Fiebre

- Motivo de alerta
- Mayor de 37°C - febrícula.
- Mayor de 38°C - fiebre.
- La temperatura corporal se incrementa por la tarde y al anochecer.
- Suele acompañarse de sensación distérmica o escalofríos.
- Fiebres muy altas podrían originar delirio y convulsiones

Alteración del nivel de conciencia - Confusión

- Pérdida de la capacidad para reaccionar con normalidad ante situaciones cotidianas.
- Si se acompaña de fiebre, disnea o labios azulados avisar a los Servicios Médicos.

Cansancio y fatiga

- Presente en casi 40% de los pacientes.
- Algunos pacientes lo manifiestan como cansancio extremo.
- Puede continuar mucho después de que el virus desaparezca incluso después de la recuperación.

Síntomas principales: FIEBRE – TOS – DISNEA

Mialgias

Problemas digestivos

Tos seca

- Tos profunda, sin presencia de cosquilleo en la garganta.
- A veces puede resultar productiva (>33% casos flemas, informe OMS)

Conjuntivitis

- Ocurre entre el 1-3% de los pacientes.
- Altamente contagiosa.
- Usar gafas en lugar de lentillas para evitar contagios.

Pérdida de olfato y/o gusto

- Efecto leve o moderado del virus.
- Suele aparecer repentinamente.
- Sobre todo en pacientes jóvenes a veces es la única sintomatología.

Dolor de cabeza - cefaleas

- La cefalea y el dolor de garganta se testó en el 14% de los pacientes.
- 5% manifestó congestión nasal.



Código: 6A - Fecha: 20.04.2020 - V.1

Elaboración propia a partir de datos publicados por las Autoridades Sanitarias

Amplia la información en www.maypesalud.com · 981 883 933 · info@maypesalud.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

SINTOMATOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

Fases de la enfermedad

INFECCIÓN Y
RESPUESTA VIRAL

FASE PULMONAR

FASE
HIPERINFLAMATORIA

Desde día: 1-7

Desde día: 8-15

Desde día: 10-15

Evolución de la enfermedad

Forma leve

80% pacientes

Forma grave

20% pacientes

- Fiebre alta, taquipnea (más de 30 ciclos respiratorios / minuto), saturación O₂ (< 93%).
- Mortalidad 1 de cada 3 por fallos cardíacos, sintomatología de sepsis y fallo multiorgánico.

Se excreta por orina y heces

Marcadores de mal
pronóstico

Incremento de Ferritina y Dímero D

Epidemiología: 95% de los fallecidos son mayores de 65 años